

VETSEL

Baytarlıq preparatları kataloqu

Baytar həkimlər, klinikalar və apteklər üçün sertifikatlı preparatlar. BelVitunifarm ASC (Belarus) istehsalı. Bakı daxilində 1 gün, regionlara 3 gün çatdırılma.

Antiparazitar	2	Antibakterial	5
Vitamin-Mineral	1	Hormonal	1

+994 50 214 24 10 (WhatsApp) info@vetsel.az vetsel.az

Məzmun

Kloziverm 3
İnyeksiya üçün məhlul

Klozantel 10% 4
İnyeksiya üçün məhlul

Oksitetrasiklin Hidroxlorid 20% 5
Peroral tətbiq üçün toz

Oksitetrasiklin Hidroxlorid 20% LA 6
İnyeksiya üçün məhlul, uzunmüddətli təsirli

Enrofloksasin 10% 7
İnyeksiya üçün məhlul

Seftiofura Hidroxlorid 8
İnyeksiya üçün suspenziya

Amoksisillin-LA 15% 9
İnyeksiya üçün suspenziya, uzunmüddətli təsirli

Trivitamin 10
Yağlı məhlul (inyeksiya və peroral)

Estrofan 11
İnyeksiya üçün məhlul

Kataloqdakı məlumat qısa xülasədir və preparatların rəsmi istifadə təlimatlarına əsaslanır. Tətbiqdən əvvəl təlimatı oxuyun. Qiymət, minimal həcm və ödəniş şərtləri sifarişə görə fərdi razılaşdırılır. Rəsmi təlimatlar və şəhadətnamələr: vetsel.az/lisenziya-ve-sertifikatlar/



ANTİPARAZİTAR

Kloziverm

İnyeksiya üçün məhlul

Kloziverm ivermektin və klozantelin birləşməsidir: bir inyeksiya ilə həm nematodlara, həm trematodlara (fassiola), həm də dəri altı və burun boşluğu parazitlərinə təsir edir.

Tərkib	İvermektin: 10 mq / 1 ml Klozantel natrium: 125 mq / 1 ml
Qablaşdırma	50, 100 və 200 ml-lik şüşə flakonlar
Heyvan növləri	Qaramal, Qoyun, Keçi
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP 4073-205-20

Göstərişlər

Diktiokaulyoz · Hemonxoz · Ostertaqioz · Trixostrongilyoz · Kooperioz · Nematodiroz · Bunostomoz · Strongiloidoz · Fassiolyoz · Telyazioz · Hipodermatoz · Estroz · Sarkoptoz (qoturluq)

Doza və tətbiq qaydası

Heyvan	Doza	Yeridilmə
Qaramal, qoyun, keçi	1,0 ml / 50 kq	Əzələdaxili və ya dərialtı, birdəfəlik

Təsiredici maddəyə görə: İvermektin 0,2 mq/kq + klozantel 2,5 mq/kq

Qoturluqda preparat 7–14 gün fasilə ilə iki dəfə yeridilir. Böyük partiyadan əvvəl 5–10 heyvanda sınaq aparılır və 3 gün müşahidə edilir.

Gözləmə müddəti

Ət üçün	35 gün
Süd üçün	Sağmal heyvanlarda tətbiq edilmir

Saxlama

Saxlama	+4…+25 °C, quru və qaranlıq yerdə
Yararlılıq	2 il

Əks-göstərişlər

Xəstə və zəifləmiş heyvanlar; Doğuşa 2 həftə qalmış boğaz heyvanlar; Arılar və balıqlar üçün toksikdir: su hövzələrinə düşməsinə yol verməyin.



ANTİPARAZİTAR

Klozantel 10%

İnyeksiya üçün məhlul

Klozantel 10% fassiolyoz, hemonxoz və hipodermatoz kimi trematod, nematod və artropod invaziyalarına qarşı tək inyeksiya ilə tətbiq olunan antigelmintikdir.

Tərkib	Klozantel natrium: 10 q / 100 ml (100 mq / 1 ml)
Qablaşdırma	Müxtəlif həcmli şüşə flakonlar
Heyvan növləri	İribuynuzlu heyvanlar, Xırdabuynuzlu heyvanlar
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP-Q-01250104

Göstərişlər

Fassiolyoz · Hemonxoz · Ezofaqostomoz · Xabertioz · Hipodermatoz · Estroz

Doza və tətbiq qaydası

Heyvan	Doza	Yeridilmə
İri və xırda buynuzlu, standart	0,25 ml / 10 kq (2,5 mq/kq)	İribuynuzlu: əzələdaxili və ya dərialtı · xırdabuynuzlu: dərialtı
İribuynuzlu, hipodermatoz	0,5 ml / 10 kq (5,0 mq/kq)	Əzələdaxili və ya dərialtı
Xırdabuynuzlu, xabertioz və fassiolyoz	0,5 ml / 10 kq (5,0 mq/kq)	Dərialtı

Təsiredici maddəyə görə: 2,5 mq/kq (hipodermatoz, xabertioz, fassiolyozda 5,0 mq/kq)

Birdəfəlik yeridilir.

Gözləmə müddəti

Ət üçün	28 gün
Süd üçün	Südü insan qidası üçün istifadə edilən heyvanlarda qadağandır

Saxlama

Saxlama	+4…+25 °C, quru və qaranlıq yerdə
Yararlılıq	36 ay
Açıldıqdan sonra	+2…+8 °C-də 28 gün

Əks-göstərişlər

Südü insan qidası üçün istifadə edilən heyvanlar.



ANTİBAKTERİAL

Oksitetrasiklin Hidroxlorid 20%

Peroral tətbiq üçün toz

Oksitetrasiklin hidroxlorid 20% peroral tətbiq üçün tozdur: iri və xırda buynuzlu heyvanlar, donuzlar və quşlarda bakterial infeksiyaların müalicəsində istifadə olunur.

Tərkib	Oksitetrasiklin hidroxlorid: 20%
Qablaşdırma	1000 q-lıq paket
Heyvan növləri	İribuynuzlu heyvanlar, Xırdabuynuzlu heyvanlar, Donuzlar, Quşlar
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP 4040-172-20

Göstərişlər

- Kolibakterioz
- Salmonellyoz
- Oksitetrasiklinə həssas digər bakterial infeksiyalar

Doza və tətbiq qaydası

Doza rejimi rəsmi istifadə təlimatında göstərilir; təlimatı satış nümayəndəmizdən ala bilərsiniz.

Gözləmə müddəti

Rəsmi təlimatda göstərilir; sorğu ilə dəqiqləşdiririk.

Saxlama

Rəsmi təlimata əsasən.



ANTİBAKTERİAL

Oksitetrasiklin Hidroxlorid 20% LA

İnyeksiya üçün məhlul, uzunmüddətli təsirli

Uzunmüddətli təsirli (LA) oksitetrasiklin: bir inyeksiyanın təsiri 72 saat davam edir, ona görə müalicə kursu az sayda yeridilmə ilə aparılır.

Tərkib	Oksitetrasiklin hidroxlorid: 0,2 q / 1 ml
Qablaşdırma	50, 100 və 200 ml-lik şüşə flakonlar
Heyvan növləri	İribuynuzlu heyvanlar, Xırdabuynuzlu heyvanlar, Donuzlar
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP 4070-202-20

Göstərişlər

Kolibakterioz · Pasterellyoz · Salmonellyoz · Mikoplazmoz · Riketsioz · Aktinomikoz · Tənəffüs və sidik-cinsiyyət yollarının infeksiyaları · Dırnaq çürüməsi · Stafilokokk infeksiyaları · Donuzlarda qızıl yel · MMA sindromu

Doza və tətbiq qaydası

Heyvan	Doza	Yeridilmə
İri və xırda buynuzlu, donuz	Təlimata əsasən (PDF)	Əzələdaxili

Lazım olduqda 72 saatdan sonra təkrar yeridilir. Bir nöqtəyə iribuynuzlularda 10 ml-dən, donuz, qoyun və keçilərdə 5 ml-dən çox yeridilmir: doza bir neçə nöqtəyə bölünür.

Gözləmə müddəti

Ət üçün	28 gün
Süd üçün	28 gün

Saxlama

Saxlama	+4...+25 °C, quru və qaranlıq yerdə
Yararlılıq	1 il
Açıldıqdan sonra	+2...+8 °C-də 28 gün

Əks-göstərişlər

Tetrasiklinlərə qarşı həssaslıq; Böyrək və qaraciyər çatışmazlığı; Boğaz heyvanlar və yeni doğulmuş balalar; Penisillin və sefalosporinlərlə birgə tətbiq edilmir.



ANTİBAKTERİAL

Enrofloksasin 10%

İnyeksiya üçün məhlul

Enrofloksasin ftorxinolon qrupundan geniş spektrli antibiotikdir: tənəffüs və həzm yollarının bakterial infeksiyalarında gündə bir dəfə yeridilir.

Tərkib	Enrofloksasin: 0,1 q / 1 ml
Qablaşdırma	10, 20, 50 və 100 ml-lik şüşə flakonlar
Heyvan növləri	Buzovlar, Quzular, Donuzlar, İtlər, Pişiklər
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP-Q-01250107

Göstərişlər

Bronxopnevmoniya · Kolibakterioz · Salmonellyoz · Mikoplazmoz · Enterit · Donuzlarda atrofik rinit · Donuzlarda enzootik pnevmoniya · MMA sindromu

Doza və tətbiq qaydası

Heyvan	Doza	Yeridilmə
Buzov, quzu	0,25–0,5 ml / 10 kq (2,5–5,0 mq/kq)	Dərialtı
Donuz	0,25–0,5 ml / 10 kq (2,5–5,0 mq/kq)	Əzələdaxili
İt, pişik	0,5 ml / 10 kq (5,0 mq/kq)	Dərialtı

Təsiredici maddəyə görə: 2,5–5,0 mq/kq

Gündə bir dəfə, 3–5 gün; xroniki hallarda 10 günə qədər. MMA sindromunda 2–5 gün.

Gözləmə müddəti

Ət üçün	14 gün
Süd üçün	Sağmal inəklərdə tətbiq edilmir

Saxlama

Saxlama	+4…+25 °C; +15 °C-dən aşağıda kristallar yarana bilər, qızdırdıqda həll olur
Yararlılıq	2 il
Açıldıqdan sonra	+2…+8 °C-də 28 gün

Əks-göstərişlər

Sağmal inəklər; Yeni doğulmuş balalar və boğaz dişilər; Böyrək xəstəlikləri; Qıcolma ilə keçən mərkəzi sinir sistemi pozuntuları; Bir yaşadək küçüklər; Tetrasiklinlər, makrolidlər, levomisetin, teofillin, QSİƏP və nitrofuranlarla birgə tətbiq edilmir.



ANTİBAKTERİAL

Seftiofura Hidroxlorid

İnyeksiya üçün suspenziya

Seftiofura hidroxlorid geniş spektrli antibiotik preparatdır: iri və xırda buynuzlu heyvanlar və donuzlarda seftiofura həssas mikroorqanizmlərin törətdiyi xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulub.

Tərkib	Seftiofura hidroxlorid: 0,05 q / 1 ml
Qablaşdırma	Müxtəlif həcmli şüşə flakonlar
Heyvan növləri	İribuynuzlu heyvanlar, Xırdabuynuzlu heyvanlar, Donuzlar
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP 4071-203-20

Göstərişlər

Tənəffüs orqanlarının infeksion xəstəlikləri · Mədə-bağırsaq traktının infeksion xəstəlikləri · Sepsis · Peritonit · Artrit · Nekrobakterioz (iribuynuzlu heyvanlar və qoyunlarda) · Doğuşdan sonrakı infeksiyalar · Mastit

Doza və tətbiq qaydası

Doza rejimi rəsmi istifadə təlimatında göstərilir; təlimatı satış nümayəndəmizdən ala bilərsiniz.

Gözləmə müddəti

Rəsmi təlimatda göstərilir; sorğu ilə dəqiqləşdiririk.

Saxlama

Rəsmi təlimata əsasən.



ANTİBAKTERİAL

Amoksisillin-LA 15%

İnyeksiya üçün suspenziya, uzunmüddətli təsirli

Amoksisillin-LA 15% uzunmüddətli təsirli penisillin qrupu antibiotikdir: həzm, tənəffüs, sidik-cinsiyyət yolları, dəri və yumşaq toxuma infeksiyalarında tətbiq olunur.

Tərkib	Amoksisillin trihidrat: 0,15 q / 1 ml
Qablaşdırma	50, 100 və 200 ml-lik şüşə flakonlar
Heyvan növləri	Qaramal, Qoyun, Donuz, İt, Pişik
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP 4069-201-20

Göstərişlər

- Mədə-bağırsaq traktının infeksiyaları
- Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları
- Sidik-cinsiyyət yollarının infeksiyaları
- Dəri və yumşaq toxuma infeksiyaları
- Mastit
- Metrit
- Poliartrit
- Absses
- MMA sindromu
- Əməliyyatdan sonrakı infeksiyalar

Doza və tətbiq qaydası

Heyvan	Doza	Yeridilmə
Qaramal, qoyun, donuz, it, pişik	1,0 ml / 10 kq (15 mq/kq)	Əzələdaxili

Təsiredici maddəyə görə: 15 mq/kq

Gözləmə müddəti

Ət üçün	Dəqiqləşdirilir
Süd üçün	Dəqiqləşdirilir

Saxlama

Saxlama	+4...+25 °C, quru və qaranlıq yerdə
Yararlılıq	2 il
Açıldıqdan sonra	+2...+8 °C-də 28 gün



VİTAMİN-MİNERAL

Trivitamin

Yağlı məhlul (inyeksiya və peroral)

Trivitamin A, D3 və E vitaminlərinin yağlı məhluludur. Kənd təsərrüfatı və ev heyvanlarında, quşlarda vitamin çatışmazlığının profilaktikası və müalicəsi üçün inyeksiya və ya peroral yolla tətbiq edilir.

Tərkib	A vitamini: 30 000 BV D3 vitamini: 40 000 BV E vitamini: 20 mq
Qablaşdırma	Şüşə flakon
Heyvan növləri	İribuynuzlu heyvanlar, Atlar, Quzular, Donuzlar, İtlər, Pişiklər, Xəzdərili heyvanlar, Ev quşları
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP-Q-01250103

Göstərişlər

- A, D və E hipo- və avitaminozlarının profilaktikası
- Hipo- və avitaminozların müalicəsi

Doza və tətbiq qaydası

Heyvan	Əzələdaxili / dərialtı	Peroral
İribuynuzlu qaramal	0,2–0,25 ml / 10 kq	0,4–0,5 ml / 10 kq (8–10 damcı)
Atlar	0,2–0,25 ml / 10 kq	0,25–0,5 ml / 10 kq (5–10 damcı)
Buzovlar, dayçalar	0,2–0,5 ml / 10 kq	0,5–0,6 ml / 10 kq (10–12 damcı)
Quzular	0,1–0,2 ml / 10 kq	0,2–0,3 ml / 10 kq (4–6 damcı)
Donuzlar	0,2–0,3 ml / 10 kq	0,2–0,5 ml / 10 kq (4–10 damcı)
Donuz balaları	0,4–1,0 ml / 10 kq	0,1–0,2 ml / 10 kq (2–4 damcı)
İtlər, pişiklər	0,2–0,3 ml / 10 kq	0,3–0,6 ml / 10 kq (6–12 damcı)
Xəzdərili heyvanlar	0,6–1,0 ml / 10 kq	1–2 ml / 10 kq (20–40 damcı)
Yetkin ev quşları	Tətbiq edilmir	0,2–0,3 ml / 10 kq (başa 4–6 damcı)
Cavan ev quşları	Tətbiq edilmir	0,1–0,2 ml / 10 kq (başa 2–4 damcı)

Cədvəldəki dozalar profilaktikadır və 12–14 gündən bir təkrarlanır. Müalicə dozası profilaktik dozadan 2–3 dəfə çoxdur.

Gözləmə müddəti

Ət üçün — Məhdudiyyət yoxdur

Saxlama

Yararlılıq — 12 ay



HORMONAL

Estrofan

İnyeksiya üçün məhlul

Estrofan sintetik prostaglandin F2α analoqu olan kloprostenol əsasında hazırlanıb. Sarı cismi geriləyir, cinsi tsiklin sinxronizasiyası və reproduktiv pozuntuların müalicəsində istifadə olunur.

Tərkib	Kloprostenol natrium: 0,25 mq / 1 ml
Qablaşdırma	10 və 20 ml-lik şüşə flakonlar
Heyvan növləri	İnək, Ana donuz, Qoyun, At
İstehsalçı	BelVitunifarm ASC, Belarus
Qeydiyyat №	BP 4775-205-21

Göstərişlər

- Uşaqlığın gecikmiş involyusiyası
- Cift ləngiməsi
- Gizli kuralama
- Cinsi tsiklin pozuntuları
- Persistent sarı cisim və lütein kistalar
- Endometrit
- Boğazlığın dayandırılması
- Kuralamanın sinxronizasiyası

Doza və tətbiq qaydası

Heyvan	Doza	Yeridilmə
İnək	2 ml	Əzələdaxili
Ana donuz	0,5–0,7 ml (boğazlığın 111-ci günündən sonra)	Əzələdaxili
Qoyun	0,5–0,7 ml	Əzələdaxili
At	1,0 ml	Əzələdaxili

İnəklərdə kuralamanın sinxronizasiyası üçün iki inyeksiya aparılır; inyeksiyalar arasındakı fasiləni təlimata əsasən dəqiqləşdirin.

Gözləmə müddəti

Ət üçün	24 saat
Süd üçün	Təlimatda göstərilməyib

Saxlama

Saxlama	+4...+25 °C, quru və qaranlıq yerdə
Yararlılıq	2 il

Əks-göstərişlər

Boğazlığın ilk üçdə biri (boğazlığı dayandırmaq məqsədi istisna olmaqla); Kəsimə göndəriləcək madyanlar.

Sifariş necə verilir

1

Müraciət

Zəng edin, WhatsApp-a yazın və ya saytdakı formu doldurun. Lazım olan preparatları və həcmi bildirin.

2

Razılaşma

Satış nümayəndəmiz minimal həcm, qiymət və ödəniş şərtlərini sifarişinizə uyğun fərdi razılaşdırır.

3

Çatdırılma

Bakı daxilində 1 gün, regionlara 3 gün ərzində çatdırırıq.

4

Sənəd və dəstək

Hər tədarüklə saxlama təlimatı verilir; təlimat və şəhadətnamə surətləri sorğu ilə təqdim olunur.

Əlaqə

Mobil və WhatsApp
+994 50 214 24 10

Ofis
+994 12 447 07 16

Satış nümayəndəsi: Ruslan Əhmədov
+994 50 497 97 67

E-poçt
info@vetsel.az

Ünvan
İmran Qasımov küçəsi 3A, AZ1022 Bakı

İş saatları
B.e.–Cümə 09:00–18:00



vetsel.az · Doza kalkulyatoru: vetsel.az/doza-kalkulyatoru/